

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

**0 358 008
A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 89115121.9

(51) Int. Cl.³: **A61K 31/505 , A61K 31/40 ,
//(A61K31/505,31:40)**

(22) Anmeldetag: 16.08.89

Ein Antrag gemäss Regel 88 EPÜ auf Berichtigung der Beschreibung (Seiten 4 und 8) liegt vor. Über diesen Antrag wird im Laufe des Verfahrens vor der Prüfungsabteilung eine Entscheidung getroffen werden (Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-V, 2.2).

(30) Priorität: 15.08.88 BG 85235/88

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
14.03.90 Patentblatt 90/11

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB LI NL SE

(71) Anmelder: RNPISMP " N.I. PIROGOV"
Boul. Tottleben 21
BG-1606 Sofia(BG)

(72) Erfinder: Alexandrov, Nikola Georgiev, Dr. med.

Komplex Mladost Bl. 335-A
Sofia(BG)

Erfinder: Vanev, Manol Tzenev, Dr. med.

Boul. Bulgaria Nr. 14

Sofia(BG)

Erfinder: Nikolova, Milka Petrova

Rayko Daskalov Strasse Nr. 3

Sofia(BG)

Erfinder: Ogneva, Vesselina Koleva, Dr. med.

Anton Ivanov Strasse Nr. 122

Sofia(BG)

Erfinder: Vitkova, Snejana Georgieva

N. Kamenov Strasse Bl. 252/4/76

Sofia(BG)

(74) Vertreter: von Fünér, Alexander, Dr. et al
Patentanwälte v. Fünér, Ebbinghaus, Finck
Mariahilfplatz 2 & 3
D-8000 München 90(DE)

(54) Ernährungstherapeutisches Mittel.

(57) Beschrieben wird ein ernährungstherapeutisches Mittel, das in der medizinischen Praxis zur Behandlung von Patienten verwendet werden kann, die parenteral oder enteral ernährt werden müssen, wie zum Beispiel bei alten Menschen und kleinen Kindern mit spezifischer Ernährungsweise.

Das erfindungsgemäße Mittel verbessert die Ernährungstherapie, beseitigt die unerwünschten Nebeneffekte der bekannten Mittel und verbessert die Resorption für Aminosäuren, Kohlehydraten und besonders für Fette. Ausgeprägt ist seine synergistische Wirkung. Das Mittel kann bei Schwerkranken angewandt werden, bei denen die einzige Ernährungsart die parenterale ist. Außerdem kann es zur raschen Genesung nach schweren Erkrankungen bei Kindern und alten Menschen und in Fällen angewandt werden, in denen es bei geistiger oder physischer Belastung zu einem erhöhten Energieverbrauch kommt.

Das Mittel enthält Fette, Eiweiße und/oder Kohlehydrate, und nootrope Stoffe, und zwar Pyracetam (2-Oxo-1-pyrrolidinacetamid), Orotsäure oder ein Gemisch beider Stoffe in einem Gewichtsverhältnis des Nahrungsgemisches zum nootropen Stoff von 10:1,1 bis 10:0,05. Der nootrope Stoff ist vorzugsweise eine Kombination von Pyracetam und Orotsäure in einem Verhältnis von 20:1.

EP 0 358 008 A1

Ernährungstherapeutisches Mittel

Die Erfindung betrifft ein ernährungstherapeutisches Mittel, das in der medizinischen Praxis zur Behandlung von Patienten verwendet werden kann, die parenteral oder enteral ernährt werden müssen, wie zum Beispiel bei alten Menschen und kleinen Kindern mit spezifischer Ernährungsweise (Diät).

Bekannt sind ernährungstherapeutische Mittel auf der Basis von Kohlehydraten, Eiweißen und Fetten. Bekannt ist zum Beispiel eine intravenös zu verabreichende Fettemulsion, die Buttersäureglyceride, Ei-Phosphate, Glycerin in wäßriger Lösung und Natronlauge zur Einstellung des neutralen pH enthält und einen Brennwert von 1,1 cal (4.601 J) pro ml Lösung aufweist (A.S. Prasad, Current Therapy, 1982, 460).

Bekannt ist auch ein ernährungstherapeutisches Mittel, das eine kristalline nichtpyrogene Lösung von Aminosäuren und eines Elektrolyten für intravenöse Infusionen darstellt, das ebenfalls für die parenterale Ernährung von Kranken verwendet werden kann (A.S. Prasad, Current Therapy, 1982, 460).

Die Nachteile der bekannten ernährungstherapeutischen Mittel bestehen in der Schwierigkeit der Resorption der Aminosäuren und der Kohlehydrate und besonders der Fette durch den Organismus und im Auftreten von Nebenerscheinungen, die besonders stark bei Patienten nach schweren Operationen, Verletzungen und Schocks zutage treten, wenn die Patienten gleichzeitig einer Ernährung mit besonders hohem Brennwert bedürfen. Diese unerwünschten Nebenerscheinungen können früh zutage treten oder Spätfolgen darstellen. Zu den früh auftretenden Nebenerscheinungen zählen Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, Temperaturerhöhung, Brust- und Rückenschmerzen, Ekelgefühl, Brechreiz und Hyperlipämie, und zu den Spätfolgen die Folgen aufgrund der Fettablagerung in der Leber, Vergrößerung von Leber und Milz, Symptome von Gelbsucht, Trombozytopenie, Leukopenie u.a.

Bekannt sind die nootropen Mittel Pyracetam, das 2-Oxo-Pyrolidinacetamid darstellt und zur Behandlung verschiedener Erkrankungen, die mit hypoxischen ischämischen und dismetabolischen Zuständen des Gehirns, Gedächtnisstörungen und verminderter Merkfähigkeit verbunden sind, verwendet werden kann (US-PA Nr. 3 459 738), die Orotsäure, welche die Uracil-4-carbonsäure bzw. das Vitamin B₁₃ darstellt und eine hepatoprotektive und antihypoxische Wirkung auf das Leberparenchym sowie teilweise auf das ZNS ausübt (US-PA Nr. 2 937 175) und das Präparat Orocetam, das ein synergistische Gemisch aus Pyracetam und Orotsäure darstellt (BL-Urheberschein Nr. 70 004 = EP-PA 87 101 630 vom 6.2.1987).

Nootrope Mittel wurden bisher nicht zu ernährungstherapeutischen Zwecken verwendet.

Die Aufgabe der Erfindung besteht in der Bereitstellung eines ernährungstherapeutischen Mittels, das zu einer Verbesserung der Resorption der Aminosäuren, Fette und Kohlehydrate im Organismus führt und geringere Nebenwirkungen aufweist.

Die Aufgabe wurde durch ein ernährungstherapeutisches Mittel auf der Basis von Fetten, Eiweißen und/oder Kohlehydraten gelöst, das nootrope Stoffe enthält, und zwar Pyracetam (2-Oxo-1-pyrolidinacetamid), Orotsäure oder ein Gemisch beider Stoffe in einem Gewichtsverhältnis des Nahrungsgemisches zu den nootropen Stoffen von 10:1,1 bis 10:0,05.

Der nootrope Stoff stellt vorzugsweise ein Gemisch aus Pyracetam und Orotsäure in einem Verhältnis von 20:1 dar.

Es wurde festgestellt, daß bei kombinierter Anwendung von Aminosäurelösung, Fettemulsion und dem nootropen Mittel Pyracetam oder Orotsäure oder einem entsprechenden Gemisch sich eine Verringerung des Lipidspiegels im Organismus und eine Wiederherstellung der Hauptstrukturelemente biologischer Membranen sowie eine Verbesserung der Resorption für Aminosäuren und Kohlehydrate in den Leberzellen feststellen läßt, was zu einer Wiederherstellung der Ultrastruktur der Hepatozyten und anderer Hauptstrukturelemente führt.

Die stärkste potenzierende Wirkung zeigt sich in einer Verringerung des Lipidspiegels in den Leberzellen und in einer Wiederherstellung ihrer Ultrastruktur. Darin zeigt sich die potenzierende Wirkung des nootropen Mittels auf die Resorption der Aminosäuren, Kohlehydrate und insbesondere der Fette.

Das erfindungsgemäße Mittel kann peroral oder vorzugsweise bei Schwerkranken intravenös angewandt werden. So zum Beispiel wird eine 10 %-ige Lösung einer Fettemulsion (Liposin) in einer Menge von 500 ml täglich tropfenweise und 4 bis 12 g Pyracetam und/oder 0,2 bis 0,6 g Orotsäure oder ein Gemisch von beiden in den angegebenen Mengen intravenös verabreicht.

Das erfindungsgemäße Mittel wurde auch als Behandlungsmethode bei 4 Patienten angewandt, und zwar jeweils dem Zustand entsprechend nach subtotaler Gastrektomie, nach korrodierender Verätzung der Speiseröhre durch Salzsäure, bei vollständiger Stenose der Speiseröhre nach korrodierender Verätzung durch Natronlauge sowie nach subtotaler Dünndarmresektion. Den Patienten wurde eine Infusion aus Fettemulsion zusammen mit einem Gemisch aus Pyracetam und Orotsäure (Orocetam) verabreicht. Die entsprechenden Testergebnisse sind in den die Erfindung illustrierenden Beispielen angegeben.

Die Vorteile des erfindungsgemäßen Mittels bestehen darin, daß die Ernährungstherapie verbessert wird, die unerwünschten Nebeneffekte der bekannten Mittel beseitigt werden und die Resorption für Aminosäuren, Kohlehydrate und besonders für Fette verbessert wird, sodaß es bei Schwerkranken angewandt werden kann, bei denen die einzige Ernährungsart die parenterale ist. Außerdem kann es zur raschen
 5 Genesung nach schweren Erkrankungen bei Kindern und alte Menschen und in Fällen angewandt werden, in denen es bei geistiger oder physischer Belastung zu einem erhöhten Energieverbrauch kommt.

Die Erfindung wird durch die nachfolgenden Ausführungsbeispiele näher erläutert:

Beispiel 1

10

Pharmakologische Untersuchungen des Lipidspiegels im Lebergewebe durch Anfärbung und mit Hilfe eines
 15 Lichtmikroskops

Untersucht wurden 14 Hunde der Rasse "Beagle", von denen 4 als Kontrolltiere und 8 als Versuchstiere verwendet wurden. Letztere wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Im Verlaufe von 8 Tagen wurden 4 Tiere
 20 täglich mit einer Fettemulsion (Liposin) bei einer Dosierung von 6,2 ml/kg Körpergewicht behandelt. Die übrigen 4 Tiere wurden nach derselben Zeit mit Fettemulsion (Liposin) bei derselben Dosis und mit einem Gemisch von Pyracetam und Orotsäure (Orocetam) in einer Menge von 1,3 ml/kg Körpergewicht behandelt. Am 8. Tag wurden die Versuchs- und Kontrolltiere abgetötet. Stücke der Leber der Tiere wurden isoliert und in neutralem Formalin (Formol) für histochemische Untersuchungen fixiert. Andere Organstücke wurden in
 25 einer Lösung von Glutaraldehyd unter nachfolgender Fixierung in OSO_4 für elektronenmikroskopische Untersuchungen fixiert.

Bei der Untersuchung des Lipidspiegels im Lebergewebe der Kontrolltiere wurde in den Hepatocyten ein normaler Gehalt an Lipidgranulat festgestellt. Die Lipide waren im zentralen und peripheren Bereich der Leber gleichmäßig verteilt (Fig. 1 bis 4). In der Wand des Gallenganges wurden einzelne Lipidgranulae
 30 festgestellt, die interlobulär verliefen (Fig. 2).

Bei den bloß mit Liposin behandelten Tieren stieg der Lipidspiegel im Lebergewebe stark an. Eine große Menge an Lipidgranulae zeigte sich in den Hepatocyten, wobei diese häufig zu größeren Tropfen zusammengefloßen waren. Die Lipidablagerungen betreffen alle Teile der Leber, und zwar sowohl das Zentrum als auch die Peripherie. Besonders stark angestiegen war die Zahl der Lipidgranulae in den
 35 Wandungen der folgenden Blutgefäße: Vena centralis, interlobuläre Verzweigungen der Vena portae und Arteria hepatica, sowie in der Wandung des parallel verlaufenden Gallenganges. Lipidablagerungen zeigten sich vorzugsweise in der Adventitia der Gefäßwänden (Fig. 5 bis 10).

Die Untersuchungen der Leber der mit Liposin und Orocetam behandelten Tiere ergab einen verringerten Lipidspiegel, der fast dem der normalen Tiere entsprach. Lipidgranulae in den Hepatocyten waren nur vereinzelt festzustellen (Fig. 11 bis 16). Betroffen waren in erster Linie im Zentrum der Leber in der Nähe der Vena centralis angeordnete Hepatocyten (Fig. 12, 14 und 16). Relativ wenig Lipide waren in den Hepatocyten an der Peripherie der Leber enthalten. Die arteriellen und venösen Gefäße waren vollkommen
 40 frei von Lipidablagerungen (Fig. 13, 15 und 16). Betroffen war lediglich die Wandung des Gallenganges.

Die Ergebnisse der elektronenmikroskopischen Untersuchungen haben Veränderungen in den membranösen Zellorganellen ergeben. In den untersuchten Hepatocyten der Leber von mit Liposin behandelten Tieren wurden Veränderungen festgestellt, wobei vor allem die membranösen Zellorganellen betroffen waren. Bei den meisten der untersuchten Hepatocyten wurden große Vakuolen festgestellt, die in den meisten Fällen im kernnahen Bereich angesiedelt waren. Wurden in einer Zelle mehrere Vakuolen
 45 festgestellt, so standen sie miteinander in Berührung (Fig. 1 und 2). Der Inhalt der Vakuolen war vorzugsweise eine feine globuläre Substanz. In manchen perikapiilar angeordneten Hepatocyten waren Teile der Zellmembran entfernt (Fig. 3). Bei den mit ihrer Oberfläche zum Disse-Raum hin orientierten Hepatocyten wurden eine Vielzahl von Mikrovilli beobachtet (Fig. 5). Bei allen untersuchten Hepatocyten wurden Lamellen von granuliertem und glattem Reticulum festgestellt. Die Mitochondrien zeigten bei der Mehrzahl der untersuchten Hepatocyten eine veränderte Ultrastruktur und desorientierte Cristae mitochondriales, die in den meisten Fällen gegen die Innenmembran der Mitochondrien entlang der zugehörigen
 50 Achse polarisiert waren. Gleichzeitig war die Mitochondrienmatrix stark aufgehellt (Fig. 4, 5 und 6). Sehr häufig stieß man auf Mikrokörperchen mit der dafür kennzeichnenden inneren Kristallstruktur. Die beobachteten Veränderungen in der Dynamik der Mitochondrien zeigen, daß die Mikrokörperchen eine späte

Abbauform der Mitochondrien sind (Fig. 6). Die Kerne der beobachteten Hepatocyten blieben intakt. Sämtliche mit dem Elektronenmikroskop untersuchten Hepatocyten zeigten einen reichen Inhalt an Glykogenkorn. Diese erhöhten die Dichte der Zytoplasmamatrix.

In den Hepatocyten der mit Liposin und Orocetam behandelten Tiere wurden Veränderungen festgestellt, welche eine Rückbildung der oben beschriebenen Veränderungen der Zellorganellen erkennen ließen. Die Kerne mit dem internuklear erweiterten Raum, die entfernten Kernmembranen und die offenen Poren sind morphologischer Ausdruck des aktiven Stoffwechsels zwischen Kern und Zytoplasma (Fig. 7 bis 9). Häufig begegnete man Liposomenstrukturen, die Lipidgranulae enthielten (Fig. 7). In den Makrovaesiculae des Golgiapparats wurden elektronisch dichte Lipoproteidkomplexe festgestellt (Fig. 8). Die Mitochondrien zeigten normale Ultrastruktur, manche von ihnen befanden sich in der Teilungsphase (Fig. 10).

In den Kupfferschen Zellen wurden starke Lipideinschlüsse festgestellt (Fig. 11). Die Resultate der morphologischen Untersuchungen des Lebergewebes von Tieren, die mit einem Kombinationspräparat aus Liposin und Orocetam behandelt worden waren, ergaben, daß diese Behandlung eindeutig zu einer Verringerung des Lipidspiegels in den Leberzellen und zu einer Wiederherstellung der Ultrastruktur der Hepatocyten führte, was die potenzierende Wirkung des Präparats Orocetam untermauert.

Beispiel 2

20

Ergebnisse der klinischen Tests mit dem erfindungsgemäßen Mittel

Mit Hilfe einer eigens entwickelten EDV-Methode zur Bewertung der Veränderungen auf der leitenden Ebene des vegetativen Nervensystems unter verschiedenen Stresssituationen wurde untersucht, ob es bei Infusion der Fettlösung möglicherweise zu einem Abbau der Stresseinwirkung auf dem Organismus kommt, außerdem wurden die Veränderungen im Adaptations-bzw. Regulationsmechanismus bei Einwirkung des Fettpräparats Liposin als solchem oder im Gemisch mit Orocetam untersucht.

Zur Bewertung der Änderung der Stresseinwirkung auf den Organismus und die leitende Ebene des Adaptations- bzw. Regulationssystems wurden die Veränderungen bei der Bildung des Herzrhythmus bei parenteral ernährten Patienten analysiert. Untersucht wurden 4 Patienten: ein Patient nach subtotaler Gastrektomie, der zweite nach korrodierender Verätzung der Speiseröhre durch Salzsäure, der dritte bei vollständiger Stenose der Speiseröhre nach korrodierender Verätzung durch Natronlauge, der auf eine Wiederherstellungsoperation vorbereitet worden war und der vierte nach subtotaler Dünndarmresektion.

Die Untersuchungen wurden in Intervallen von 48 Stunden durchgeführt, wobei bei den ersten beiden Patienten eine Infusion von lediglich Liposin ohne Orocetam verabreicht wurde. Untersuchungsdauer pro Patient: 8 Tage. Die Patienten wurden in zwei Gruppen eingeteilt: Gruppe A mit zwei Untersuchungen bei Infusion von lediglich Liposin und Gruppe B mit zwei Untersuchungen bei Infusion von Liposin und Orocetam. Die Liposininfusion erfolgte nach Verabreichung von 1000 E Heparin bei einer Geschwindigkeit von 30 cal/min. Bei den Patienten der zweiten Gruppe wurden auch 2 Ampullen Orocetam aus einer Flasche mit 10 %-iger Glukose vor und während der Liposininfusion zugetropft.

Die Untersuchungen wurden in Intervallen von 48 Stunden durchgeführt, wobei bei den ersten beiden Patienten eine Fettemulsion von lediglich Liposin ohne Orocetam verabreicht wurde. Untersuchungsdauer pro Patient: 8 Tage. Regelmäßig untersucht wurden die SGOT- und SGPT-Werte, die Alkaliphosphatase und das Lipidprofil. Mit Hilfe der EDV-Methode wurden die Werte folgender Indices festgestellt: Index des vegetativen Gleichgewichts (IVG), Index des adequate Charakters der peripheren Regulation (IAPR), vegetativer Rhythmusindex (VRI), Spannungsindex (SI), Verdichtungsindex (VI), Pulsfrequenz (PF).

Bei der Untersuchung der Gruppe A ergab die Auswertung der erhaltenen Daten nur geringfügige Abweichungen in den Routineparametern wie Pulsfrequenz, Schwankungen im arteriellen Druck, doppelte Ableitung.

Die Variationsanalyse im R-R-Intervall zeigte eine ansteigende Tendenz bei entsprechendem Anstieg der SI- und VIR-Werte.

Bei der Untersuchung der Gruppe B wurden analoge Veränderungen in den erhaltenen Werten festgestellt, wobei eine raschere Wiederherstellung der Werte der Variationsanalyse nach 12 Stunden festgestellt wurde. Die Veränderungen können als "Streßänderungen" bei beibehaltender Adaptation interpretiert werden. Die Tendenz zur fast vollständigen Wiederherstellung des Ausgangshistogramms wurde in Gruppe A festgestellt und bei der Gruppe B nach 12 Stunden.

Die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen bestätigen die erhöhte Wirkung der Infusion von Liposin zusammen mit Orcetam oder allein mit Pyracetam oder Orotsäure. Die stabilen Extremwerte der Pulsfrequenz, der Blutdruck und die doppelte Ableitung zeigen die Beibehaltung der Adaptations- bzw. Regulationsmechanismen. Festgestellt wurde eine frühere Wiederherstellung der Werte der Variationsanalyse bei Anwendung von Liposin mit Orcetam.

Die bei jedem Patienten erzielten Ergebnisse sind in den Tabellen 1 bzw. 2 bis 4 zusammengefaßt.

Tabelle 1

Nr. des Versuchs	PF		SI		VIR		II		DA	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	74	78	75	81	9,4	10,1	115	115	8510	8970
2	82	74	108	94	10	12	120	125	9840	9250
3	76	82	84	91	9,6	11,4	130	130	9880	10660
4	88	84	107	100	10,2	14	110	120	9680	10080
5	90	86	118	114	13,2	12,8	120	125	10800	10750
6	84	88	184	190	16,1	17,6	140	140	11760	12320
7	96	90	192	188	16,8	15	130	120	12480	10800
8	90	94	180	201	15,6	17,4	140	130	12600	12220
arithmetisches Mittel	85	84,5	130,6	132,4	12,6	12,7	126	126	10710	10647
PF = Pulsfrequenz SI = Streß-Index VIR = vegetativer Rhythmusindex II = Intervalle DA = doppelte Ableitung A = Patientengruppe, die lediglich Liposininfusionen erhielten; B = Patientengruppe, die Liposin und Orcetam erhielten										

Tabelle 2

Nr. des Versuchs	PF		SI		VIR		II		DA	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	88	90	1245	1640	84	86	125	125	11000	11250
2	94	86	640	784	34	35	120	130	11280	11180
3	80	84	324	551	26	37	140	135	11200	11340
4	84	86	472	470	22,6	22	110	115	9240	9890
5	102	100	1840	1470	76	56	130	120	13260	12000
6	88	86	648	704	48	50,5	140	145	12320	12470
7	84	104	1060	1740	52	64	125	130	10500	13520
8	108	98	340	280	28	23,5	145	140	15660	13720
arithmetisches Mittel	91	92	821,1	955	46,3	46,8	129	130	11709	11960

PF = Pulsfrequenz
 SI = Streß-Index
 VIR = vegetativer Rhythmusindex
 II = Intervalle
 DA = doppelte Ableitung
 A = Patientengruppe, die lediglich Liposininfusionen erhielten;
 B = Patientengruppe, die Liposin und Orcetam erhielten

Tabelle 3

Nr. des Versuchs	PF		SI		VIR		II		DA	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	80	80	456	120	27,4	12,4	120	120	9600	9600
2	86	78	216	102	12,4	12,8	120	115	10320	8970
3	80	80	204	108	18,4	11,8	145	140	11600	11200
4	86	78	184	98	13,6	11,6	110	115	9460	8970
5	96	92	1080	211	48,4	11,4	135	130	12960	11960
6	88	88	143	140	12,6	10,8	140	140	12320	12320
7	80	84	865	240	39,4	13,8	130	120	10400	10920
8	100	86	310	270	27,3	21,4	140	140	14000	12040
arithmetisches Mittel	87	83	432	161	25,4	13,3	130	128	11310	10580

PF = Pulsfrequenz
 SI = Streß-Index
 VIR = vegetativer Rhythmusindex
 II = Intervalle
 DA = doppelte Ableitung
 A = Patientengruppe, die lediglich Liposininfusionen erhielten;
 B = Patientengruppe, die Liposin und Orcetam erhielten

Tabelle 4

Nr. des Versuchs	PF		SI		VIR		II		DA	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	84	78	82	96	10,1	11,4	120	120	10080	9360
2	80	76	114	102	12,6	11,1	125	125	10000	9500
3	76	78	106	90	11,8	9,4	125	120	9500	9360
4	80	82	91	76	10,1	9,1	110	115	8800	9430
5	84	86	80,4	56,4	8,9	8,1	120	120	10080	10320
6	88	78	104	50,4	13,4	7,8	145	140	12760	12320
7	90	76	132	86	14,8	8,7	125	125	11250	9500
8	82	80	148	121	12,6	12,8	145	135	11890	10800
arithmetisches Mittel	83	80	107	85	11,8	9,8	128	125	10624	10000
PF = Pulsfrequenz SI = Streß-Index VIR = vegetativer Rhythmusindex II = Intervalle DA = doppelte Ableitung A = Patientengruppe, die lediglich Liposininfusionen erhielten; B = Patientengruppe, die Liposin und Orocetam erhielten										

I Lichtmikroskopie

Histochemischer Nachweis der Lipide im Lebergewebe der Kontrolltiere

Färbung mit Oilared

1. Zentraler Teil des Leberlappens

Vergrößerung: 150-fach

V.C. - Vena centralis

2. Interlobulärer Raum, einzelne Lipidgranulae in den Hepatocyten und im Gallengang.

Vergrößerung: 630-fach

V. - Vena portae

A. - Arteria hepatica

dCh - Gallengang

3. Bereich der Hepatocyten des zentralen Teils des Leberlappens

Vergrößerung: 630-fach

L4 - Lipidgranulae

4. Hepatocyten des peripheren Teils des Leberlappens.

Vergrößerung: 630-fach

Behandlung mit Liposin

Färbung mit Oilared

5. Lipidgranulae in Bindegewebelementen des interlobulären Raums.
Vergrößerung: 150-fach
6. Teil der Wandung der Vena centralis von Lipiden eingenommen, Lipidgranulae in den benachbarten Hepatocyten.
5 Vergrößerung: 630-fach.
7. Lipidgranulae in Hepatocyten im zentralen Teil des Leberlappens.
Vergrößerung: 630-fach
8. Lipidablagerungen in der Wandung der Gefäße des interlobulären Raums und der Umgebung der Hepatocyten.
10 Vergrößerung: 630-fach
9. Massive Lipidinfiltrationen in die Wandung der Vena centralis und die angrenzenden Hepatocyten.
Vergrößerung: 630-fach
10. Lipidablagerungen im peripheren Bereich des Leberlappens.
Vergrößerung: 630-fach
- 15 Histochemischer Nachweis der Lipide im Lebergewebe von mit Liposin und Orocetam behandelten Tieren

20 Färbung mit Oilared

11. Interlobulärer Raum mit venösem und arteriellem Gefäß und Gallengang.
Vergrößerung: 150-fach
12. Teil der Wandung der Vena centralis und angrenzende Hepatocyten.
25 Vergrößerung: 630-fach
13. Interlobulärer Raum, Gefäßtriade, Lipide in der Wandung des Gallengangs.
Vergrößerung: 630-fach
14. Hepatocyten des zentralen Teils des Leberlappens.
Vergrößerung: 630-fach
15. Periphere Bereiche des Leberlappens mit einem Teil der Wandung einer Vene und Gallengang
30 Vergrößerung: 630-fach
16. Hepatocyten in der Nähe des interlobulären Gefäßes.
Vergrößerung: 630-fach

35

II. Elektronenmikroskopie

1. Teil der Hepatocyten des Lebergewebes von mit Liposin behandelten Hunden. Um den Kern angeordnete, in Kontakt stehende Vakuolen (Pfeil). Anhäufung von Glykogengranulae im Zytoplasma
40 Vergrößerung: 18.200-fach
N - Kern
V - Vakuole
GI - Glykogen
2. Intakter Hepatocytenkern des Lebergewebes von mit Liposin behandelten Hunden. Feine globuläre Substanz in den Vakuolen.
45 Vergrößerung: 18.200-fach
3. Entfernung von Bereichen der Zellmembran der Hepatocyten von mit Liposin behandelten Hunden (Pfeile).
Vergrößerung: 15.000-fach
4. Mitochondrien mit veränderter, zur Peripherie hin polarisierter Orientierung der Cristae (M), granuliertes endoplasmatisches Reticulum /ER/, Glykogengranulae (GI).
50 Vergrößerung: 52.000-fach
5. Mikrovillöse Oberfläche der Hepatocyten von mit Liposin behandelten Hunden (Pfeile), veränderte Mitochondrien (M).
55 Vergrößerung: 50.000-fach
6. Sich zu Mikrokörperchen verändernde Mitochondrien und sich bildender kristalliner Kern (M-Pfeile).
Vergrößerung: 61.000-fach

7. Teil der Hepatocyten des Lebergewebes von mit Liposin und Orocetam behandelten Hunden. Kernnaher Raum erweitert (N-Sternchen), Golgiapparat mit elektronisch dichten Lipoproteidkomplexen (AG). Lissom mit Lipideinschlüssen (L).

Vergrößerung: 23.000-fach

5 8. Erweiterter kernnaher Raum von Hepatocyten des Lebergewebes von mit Liposin und Orocetam behandelten Hunden (N-Sternchen)

Vergrößerung: 39.000

9. Unklare Struktur der Zellmembran von Hepatocyten (Pfeile). Mitochondrien mit tubulösen intramitochondrialen Bildungen und Lipofuscingranulae (M).

10 Vergrößerung: 39.000-fach

10. Sich teilende Mitochondrien in Hepatocyten des Lebergewebes von mit Liposin und Orocetam behandelten Hunden.

Vergrößerung: 54.000-fach

15 11. Teil einer Kupfferschen Zelle des Lebergewebes von mit Orocetam und Liposin behandelten Hunden. Lissomenbildungen mit Lipideinschlüssen.

Vergrößerung: 48.000-fach

12. Aufblähung der Mitochondrien und Aufhellung der Matrix Hepatocyten des Lebergewebes von mit Liposin und Orocetam behandelten Hunden.

Vergrößerung: 56.000-fach

20

Ansprüche

25 1. Ernährungstherapeutisches Mittel auf der Basis von Fetten, Eiweißen und/oder Kohlehydraten, dadurch gekennzeichnet, daß es nootrope Stoffe enthält und zwar Pyracetam (2-Oxo-1-pyrrolidin-acetamid), Orotsäure oder ein Gemisch beider Stoffe in einem Gewichtsverhältnis des Nahrungsgemisches zum nootropen Stoff von 10:1,1 bis 10:0,05.

2. Mittel nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet, daß der nootrope Stoff ein Gemisch von Pyracetam und Orotsäure im Verhältnis 20:1 darstellt.

30

35



40

45



50

55

low white bright / Newly Inc
Not yet finished






Neuroligand / Activity field
Neuroligand / Activity field



1.00 Interleaved / Newly filed
Newellomem d49368



- 1 -

EPAA-38141.



Insufficiently studied
Nouvellement de la

EPAA-3814



EPAA-38141

100. emulsion / New / Ind
Nouvellement d'usage



EPAA-38141



Non-Cellular / Non-Cellular

Neu eingezeichnet
Nouvellement déposé

EPAA-33141.9




EPA-38141.9

Neu eingereicht / Nouvellement déposé




EPA-38141.9

Neu eingereicht / Newly filed
Nouvellement déposé



EPAA-38141.9

Not eingereicht
Notvollständig




Neu emendat / Modified
Nouvellement / Modified

EPAA- 38141.9



Neu eingereicht / Newly filed
Nouvellement déposé

EPAA-38141.9



Nou eingetrich / Nouy mod
Neuvellament 19229


EP 0 358 008 A1

EP 114 - 38141.9



Neu eingereicht / Newly filed
Nouvellement déposés

EPAA-38141.9



EP 0 358 008 A1

Neu eingereicht / newly filed
Nouvellement déposé

EPAA-38141.9



EPAA - 38141.9


Nau cingerchidit / Nouvellement déposée




EP 0 358 008 A1

neu eingebracht / neu
Nouvellement déposé


EPAA-38141.9





NOT CLASSIFIED
NOV 20 1994

EPAA - 38141.9





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 89 11 5121

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. CL5)
X	EP-A-0 246 177 (G.H. CLARK) * Anspruch 1; Spalte 6, Zeilen 13-18; Spalte 9, Zeilen 25-41; Spalte 12, Zeilen 28-31 * ---	1	A 61 K 31/505 A 61 K 31/40 // (A 61 K 31/505 A 61 K 31:40)
X	BE-A- 643 404 (CHEMOFORMA) * Ansprüche 1,11,14 * ---	1	
P,X	EP-A-0 278 013 (S O "PHARMACHIM") * Anspruch; Seite 3, Zeilen 35-42; Beispiel 7 * ---	1	
A	CHEMICAL ABSTRACTS, Band 102, 1985, Seite 44, Zusammenfassung Nr. 179029r, Columbus, Ohio, US; N.N. KARKISHCHENKO et al.: "Comparative study of some parameters of the antidepressant activity of potassium orotate and piracetam", & FARMAKOL. TOKSIKOL. (MOSCOW) 1985, 48(2), 32-5 * Zusammenfassung * -----	1,2	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. CL5)
			A 61 K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 01-12-1989	Prüfer PEETERS J.C.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		I : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ----- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1501 03.82 (P0403)